

Tabelle1

Vergleich der Insektenvorkommen in verschiedenen Grünlandlebensräumen im Rahmen des Insektenwochenendes am 01. und 02.08.2020 durch Lohsack e.V. und Vera e.V. auf der Streuobstwiese Mühlenbarbek (siehe <a href="http://www.die-obstwiese.de">www.die-obstwiese.de</a> ) und bei Vere e.V. (siehe <a href="http://www.vera-rantzau.de">www.vera-rantzau.de</a> )										
Insekt	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	01.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020
	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Streuobstwiese	Mähwiese, krautreich, konventionell	Weide, kurzrasig Bioland	Acker-Kratzdistel- bestand, Bioland	Sumpfwiese, Bioland	Mähwiese, extensiv	Mähwiese, intensiv
	Niederung	Trockene Mitte	Frische, blütenarme Niederung	Umgebung des Tümpels						
<b>Hautflügler:</b>										
Ackerhummel		sehr wenig							sehr wenig	
Honigbiene	wenig	wenig	wenig	wenig		sehr wenig	mäßig	wenig	sehr wenig	
Hummel				wenig						
Hummel, hinten orange, aber keine Steinhummel			sehr wenig			sehr wenig				
Hummel, vorne orange									sehr wenig	
Kleine Hummel						sehr wenig				
Schlupfwespe						sehr wenig				
Steinhummel									sehr wenig	
Wespe		viel (in Erdnestern)			sehr wenig			wenig	wenig, angriffsfreudig	
Wespe							wenig			
Wildbiene	wenig				sehr wenig				sehr wenig	
<b>Heuschrecken:</b>										
Dornschröcke				sehr wenig						
Feldheuschrecken	sehr viel	viel	sehr viel	viel	viel	sehr wenig	mäßig	viel	wenig	viel
Großes Heupferd			sehr wenig	sehr wenig						
Kurzflügelige Schwertschröcke								wenig		
Roesels Beißschröcke				sehr wenig	sehr wenig			wenig	mäßig	sehr wenig
Sumpfschröcke								viel	wenig	sehr wenig
<b>Käfer:</b>										
blauer Käfer									sehr wenig	
Kleiner roter Käfer							sehr wenig			
Kurzflügler in Dung						wenig				
Orangeroter Dungkäfer						wenig				
Rapskäfer						sehr wenig				
Rotbrauner Weichkäfer	viel	viel		viel	sehr wenig	sehr wenig			sehr wenig	
Runder Blattkäfer			sehr wenig							
Schwarzer Dungkäfer						wenig				
Siebenpunkt Marienkäfer					sehr wenig				sehr wenig	
<b>Libellen:</b>										
Gebänderte Prachtlibelle									wenig	
Kleinlibelle, 3 unterschiedliche				wenig						
<b>Schmetterlinge:</b>										
Brauner Waldvogel = Schornsteinfeger			sehr wenig						sehr wenig	
Dickkopf-Falter					sehr wenig					
Distelfalter							sehr wenig			
Gammaeule					sehr wenig					
Geistchen			wenig							
Hauhechel-Bläuling		sehr wenig	sehr wenig					sehr wenig	sehr wenig	
Jakobs-Kreuzkraut-Blutbär (Raupe)	viel	mäßig								
Kleiner Kohlweißling									wenig	
Kleines Wiesenvögelchen = Kleiner Heufalter		sehr wenig		sehr wenig					sehr wenig	
Landkärtchen							sehr wenig			
Orange-rot gestreifter Falter				sehr wenig						
Rapsweißling									sehr wenig	
Schwarzkolbiger Braundickkopf									sehr wenig	
Tagpfauenauge									sehr wenig	
Waldbrettspiel				sehr wenig						
Weißer Kleinschmetterling	viel	mäßig	viel		viel		mäßig	viel	viel	wenig
Weißling (nicht näher bestimmt)	wenig			sehr wenig			sehr wenig		wenig	
Zitronenfalter									sehr wenig	
<b>Wanzen:</b>										
grüne Wanze									sehr wenig	
Kleine gelbgrüne Wanze						sehr wenig				
<b>Zikaden:</b>										
Blaugrüne Zikade	mäßig			sehr wenig				viel	wenig	sehr wenig
<b>Zweiflügler:</b>										
Dänische Eintagsfliege									sehr wenig	
Graue Fleischfliege	mäßig				sehr wenig			wenig	wenig	sehr wenig
Hummel-Keilschwebfliege							sehr wenig	sehr wenig		
Kleine Fliegen						sehr wenig		wenig		
Mistbiene							wenig		sehr wenig	
Raubfliege Asilus crabroniformis					sehr wenig	sehr wenig				
Schwebfliege					sehr wenig		sehr wenig	wenig		
Skorpionsfliege			sehr wenig							
Stabschwebfliege									sehr wenig	
Wiesenschnake								sehr wenig	wenig	sehr wenig
<b>Kategorien der Häufigkeit:</b>										
sehr wenig										
wenig										
mäßig										
viel										
sehr viel										
<b>Anmerkung:</b>										
Ein wissenschaftlicher Anspruch besteht nicht. Es soll lediglich ein erster Einblick in die Insektenwelt und ihre Lebensräume gegeben werden. Alle Taxa wurden nach bestem Wissen und Gewissen vermerkt.										
Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist nur bedingt möglich, da unterschiedliche Zeiten aufgewendet wurden, die Gruppenteilnehmer/-innen variierten und nur je eine Untersuchung erfolgte.										
Ferner verbesserte sich das Wetter im Laufe des Sonntages. Es handelt sich lediglich um eine Momentaufnahme, die nicht annähernd vollständig ist.										